

膵臓癌レジメン一覧

術後補助

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
GEM療法	ゲムシタビン	Day1・8・15	点滴静注	30分	1000mg/m ²	28日	軽	6コース

進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
GEM療法	ゲムシタビン	Day1・8・15	点滴静注	30分	1000mg/m ²	28日	軽	－
FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	85mg/m ²	14日	高	－
	レボホリナート	Day1	点滴静注	120分	200mg/m ²			
	イリノテカン	Day1	点滴静注	90分	180mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	3分	400mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1-2	持続静注	46時間	2400mg/m ²			
GS療法	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m ²	21日	中	－
	エスワン	Day1夕-Day15朝	内服	－	80mg/m ² /Day			
nabPAC+GEM療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1・8・15	点滴静注	30分	125mg/m ²	28日	中	－
	ゲムシタビン	Day1・8・15	点滴静注	30分	1000mg/m ²			

神経内分泌腫瘍【膵NEC】レジメン一覧

姑息的

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
EP療法	エトポシド	Day1-3	点滴静注	90分	100mg/m ²	21日	高	－
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	100mg/m ²			
FOLFIRI療法	レボホリナート	Day1	点滴静注	120分	200mg/m ²	14日	中	－
	イリノテカン	Day1	点滴静注	90分	150mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	3分	400mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1-2	持続点滴	46時間	2400mg/m ²			