

食道癌レジメナー覧

化学放射線

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
CDDP+5FU+RTx 療法	フルオロウラシル	Day1-4・29-32	持続点滴	96時間	700mg/m ²	56日	高	-
	シスプラチン	Day1・29	点滴静注	60分	70mg/m ²			
biweeklyDCF+RTx療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	35mg/m ²	14日	高	3コース
	フルオロウラシル	Day1-5	持続点滴	96時間	400mg/m ²			
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	40mg/m ²			

進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
CDDP+5FU 療法	フルオロウラシル	Day1-5	持続点滴	96時間	800mg/m ²	28日	高	-
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/m ²			
DCF療法	ドセタキセル	Day1・15	点滴静注	60分	30mg/m ²	28日	高	-
	フルオロウラシル	Day1-5	持続点滴	96時間	800mg/m ²			
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	80mg/m ²			
weekly PAC療法	パクリタキセル	Day1・8・15・22・29・36	点滴静注	60分	100mg/m ²	49日	軽	-
DOC療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	70mg/m ²	21日	軽	-
DOC+NDP療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	30mg/m ²	14日	中	-
	ネダプラチン	Day1	点滴静注	90分	40mg/m ²			
Nivolumab療法【240mg/body】	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	最小	-
FOLFOX療法	レボホリナート	Day1	点滴静注	120分	200mg/m ²	14日	中	-
	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	85mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	3分	400mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1-2	持続点滴	46時間	2400mg/m ²			