

胃がんレジメン一覧

術後補助

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
SOX療法	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	100mg/m ²	21日	中	8コース
	S-1	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m ² /Day			
S-1+DOC療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	40mg/m ²	21日	軽	6コース
	S-1	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m ² /Day			

進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
S-1+CDDP(SPIRIT)療法	S-1	Day1-Day21	内服	-	80mg/m ² /Day	35日	高	-
	シスプラチン	Day8	点滴静注	90分	60mg/m ²			
XP療法	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/m ²	21日	高	-
	カペシタビン	Day1夕-Day15朝	内服	-	2000mg/m ² /Day			
biweekly CPT-11+CDDP療法	イリノテカン	Day1・15	点滴静注	90分	60mg/m ²	28日	高	-
	シスプラチン	Day1・15	点滴静注	60分	30mg/m ²			
mFOLFOX6療法	レボホリナート	Day1	点滴静注	120分	200mg/m ²	14日	中	-
	オキサリプラチン	Day1	点滴静注		85mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	3分	400mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	46時間	2400mg/m ²			
Ramucirumab+PAC療法	ラムシルマブ	Day1・15	点滴静注	60分	8mg/kg	28日	軽	-
	パクリタキセル	Day1・8・15	点滴静注	60分	80mg/m ²			
Ramucirumab+nabPAC療法	ラムシルマブ	Day1・15	点滴静注	60分	8mg/kg	28日	軽	-
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1・8・15	点滴静注	30分	100mg/m ²			
Ramucirumab療法	ラムシルマブ	Day1	点滴静注	60分	8mg/kg	14日	最小	-
biweekly CPT-11療法	イリノテカン	Day1・15	点滴静注	90分	150mg/m ²	28日	中	-
weekly CPT-11療法	イリノテカン	Day1・8・15	点滴静注	90分	100mg/m ²	28日	中	-
wPAC療法	パクリタキセル	Day1・8・15	点滴静注	60分	80mg/m ²	28日	軽	-
DOC療法	ドセタキセル	Day1	点滴静注	60分	60mg/m ²	21日	軽	-
weekly nab-PAC療法	アルブミン懸濁型パクリタキセル	Day1・8・15	点滴静注	30分	100mg/m ²	21日	軽	-
Nivolumab療法【240mg/body】	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	最小	-
SOX療法	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	100mg/m ²	21日	中	-
	S-1	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m ² /Day			
CapeOX	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	130mg/m ²	21日	中	-
	カペシタビン	Day1夕-Day15朝	内服	-	2000mg/m ² /Day			
XP+Trastuzumab療法	トラスツズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目以降) 30分	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg	21日	高	-
	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	80mg/m ²			
	カペシタビン	Day1夕-Day15朝	内服	-	2000mg/m ² /Day			
XELOX+HER療法	トラスツズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目以降) 30分	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg	21日	中	-
	オキサリプラチン	Day1	点滴静注	120分	130mg/m ²			
	カペシタビン	Day1夕-Day15朝	内服	-	2000mg/m ² /Day			
SP+HER療法	トラスツズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目以降) 30分	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg	21日	高	-
	シスプラチン	Day1	点滴静注	90分	60mg/m ²			
	S-1	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m ² /Day			
triweekly HER療法	トラスツズマブ	Day1	点滴静注	(初回) 90分 (2回目以降) 30分	(初回) 8mg/kg (2回目以降) 6mg/kg	21日	最小	-
FOLFOX6+Nivolumab療法	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	中	-
	レボホリナート	Day1	点滴静注	120分	200mg/m ²			
	オキサリプラチン	Day1	点滴静注		85mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1	点滴静注	10分	400mg/m ²			
	フルオロウラシル	Day1-2	持続静注	46時間	1200mg/m ²			

神経内分泌腫瘍【胃がん】レジメン一覧

術前・術後

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
EP療法	エトポシド	Day1-3	点滴静注	90分	100mg/m ²	21日	高	-
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	100mg/m ²			