

## 胆道がんレジメン一覧

## 進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
GEM療法	ゲムシタビン	Day1・8・15	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	28日	軽	-
CDDP+GEM(GC)療法	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	21日	中	-
	シスプラチン	Day1・8	点滴静注	60分	25mg/m <sup>2</sup>			
GEM+S-1(GS)療法	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	21日	中	-
	TS-1	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m <sup>2</sup> /Day			
GEM+CDDP+S-1(GCS)療法	ゲムシタビン	Day1	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>	14日	高	-
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	25mg/m <sup>2</sup>			
	TS-1	Day1夕-Day8朝	内服	-	80mg/m <sup>2</sup> /Day			
CDDP+GEM(GC)療法	デュルバルマブ	Day1	点滴静注	60分	1500mg/body	21日	中	-
	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m <sup>2</sup>			
	シスプラチン	Day1・8	点滴静注	60分	25mg/m <sup>2</sup>			