

悪性リンパ腫レジメン一覧

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
CHOP療法 (非ホジキンリンパ腫)	ドキシソルピシン	Day1	点滴静注	30分	50mg/m <sup>2</sup>	21日	高	6-8コース
	ビンクリスチン	Day1	点滴静注	15分	1.4mg/m <sup>2</sup>			
	シクロホスファミド	Day1	点滴静注	120分	750mg/m <sup>2</sup>			
	プレドニゾン	Day1-5	内服	-	100mg/日			
R-CHOP療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	21日	高	6-8コース
	ドキシソルピシン	Day2	点滴静注	30分	50mg/m <sup>2</sup>			
	ビンクリスチン	Day2	点滴静注	15分	1.4mg/m <sup>2</sup>			
	シクロホスファミド	Day2	点滴静注	120分	750mg/m <sup>2</sup>			
	プレドニゾン	Day1-5	内服	-	100mg/日			
R-THP-COP療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	21日	高	6-8コース
	ピラルピシン	Day2	点滴静注	30分	40mg 80歳以上では30mg/m <sup>2</sup>			
	ビンクリスチン	Day2	点滴静注	15分	2mg/m <sup>2</sup>			
	シクロホスファミド	Day2	点滴静注	120分	650mg 80歳以上では400mg/m <sup>2</sup>			
	プレドニゾン	Day2-6	内服	-	40mg/日			
R-THP-COP(VDS フィルテシン)療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	21日	高	6-8コース
	ピラルピシン	Day2	点滴静注	30分	40mg 80歳以上では30mg/m <sup>2</sup>			
	ビンデシン	Day2	点滴静注	15分	2.1mg/m <sup>2</sup>			
	シクロホスファミド	Day2	点滴静注	120分	650mg 80歳以上では400mg/m <sup>2</sup>			
	プレドニゾン	Day2-6	内服	-	40mg/日			
Rituximabu(導入)療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	7日	最小	4-8コース
Rituximab(維持)療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	56日	最小	-

中枢神経原発悪性リンパ腫レジメン一覧

R-MPV療法	リツキシマブ	Day1	点滴静注	(初回)25mL/hで開始 (2回目以降)100mL/hで開始	375mg/m <sup>2</sup>	14日	中	5-7コース
	メトトレキサート	Day2	点滴静注	120分	3500mg/m <sup>2</sup>			
	オンコピン	Day2	点滴静注	全開で	1.4mg/m <sup>2</sup>			
	プロカルバジン	Day2-8	内服	-	100mg/m <sup>2</sup> /日 ※奇数コース			