

## 腎細胞癌レジメン一覧

## 進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	総コース数
Nivolumab240mg+Ipilimumab療法	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	21日	最小	4コース (4コース終了後はNivolumab療法へ)
	イピリムマブ	Day1	点滴静注	30分	1mg/kg			
Nivolumab療法【240mg/body】	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	最小	-
Nivolumab療法【480mg/body】	ニボルマブ	Day1	持続点滴	30分	480mg/body	28日	最小	-
Temsirolimus療法	テムシロリムス	Day1	点滴静注	30分(初回60分)	25mg/body	7日	最小	-
Pembrolizumab【200mg】 + Lenvatinib 療法【3週毎】	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	200mg/body	21日	中	35コース
	レンパチニブ	連日	内服	-	20mg/日			
Pembrolizumab【400mg】 + Lenvatinib 療法【6週毎】	ペムブロリズマブ	Day1	点滴静注	30分	400mg/body	42日	中	18コース
	レンパチニブ	連日	内服	-	20mg/日			
Nivolumab240mg+Cabozantinib療法	ニボルマブ	Day1	点滴静注	30分	240mg/body	14日	最小	-
	カボザンチニブ	連日	内服	-	40mg/日			