

胆道癌レジメン一覧

進行・再発

レジメン名	薬剤名	投与日	投与方法	投与時間	投与量	期間	催吐リスク	
GEM療法	ゲムシタビン	Day1・8・15	点滴静注	30分	1000mg/m ²	28日	軽	
CDDP+GEM(GC)療法	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m ²	21日	中	
	シスプラチン	Day1・8	点滴静注	60分	25mg/m ²			
GEM+TS-1(GS)療法	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m ²	21日	中	
	エスワン	Day1夕-Day15朝	内服	-	80mg/m ² /Day			
GEM+CDDP+TS-1(GCS)療法	ゲムシタビン	Day1	点滴静注	30分	1000mg/m ²	14日	高	
	シスプラチン	Day1	点滴静注	60分	25mg/m ²			
	エスワン	Day1夕-Day8朝	内服	-	80mg/m ² /Day			
CDDP+GEM+Duruvalumab療法	デュルバルマブ	Day1	点滴静注	60分	1500mg/body	21日	中	最大8コース その後デュルバルマブのみ4週毎投与
	ゲムシタビン	Day1・8	点滴静注	30分	1000mg/m ²			
	シスプラチン	Day1・8	点滴静注	60分	25mg/m ²			
Durvalumab維持療法	デュルバルマブ	Day1	点滴静注	60分	1500mg/body	28日	最小	